

## Aufgaben zu Kapitel 6

Aufgabe 1: (\*) Ein Fixpunktsatz. Fixpunktiteration

Aufgabe 2: Numerisches Beispiel für eine Fixpunktiteration

Aufgabe 3: (\*) Eine Theorie-Aufgabe zu Stetigkeit und Cauchyfolgen

Aufgabe 4: Abschätzung des Effektes eines Messfehlers

Aufgabe 5: Untersuchung von Polstellen

Aufgabe 6: Ein Polylogarithmus

Aufgabe 7: (\*) Wie viele Nullstellen?

Aufgabe 8: Beispiele zur Lipschitz-Stetigkeit

Aufgabe 9: (\*) Beispiele für theorielastige Prüfungsaufgaben

Aufgabe 10: Bijektivität und Umkehrfunktion

Sei  $f: [a, b] \rightarrow [a, b]$  eine stetige Funktion.

a) Zeigen Sie:

*Die Funktion  $f(x)$  besitzt in  $[a, b]$  mindestens einen Fixpunkt  $x^*$ , d.h.  $x^* \in [a, b]$  mit der Eigenschaft  $x^* = f(x^*)$ .*

Hinweis: Wenden Sie den Zwischenwertsatz auf  $g(x) = x - f(x)$  an.

b) Die Funktion  $f$  sei sogar Lipschitz-stetig mit Lipschitzkonstante  $L < 1$ , d.h.  $f$  ist eine sogenannte *Kontraktion*.

Zeigen Sie: *Der Fixpunkt  $x^*$  ist eindeutig.*

c) Unter den Voraussetzungen gemäß b) kann man den Fixpunkt  $x^*$  iterativ approximieren:

Ausgehend von einem Startwert  $x_0 \in [a, b]$  berechnet man

$$x_{i+1} := f(x_i), \quad i = 0, 1, 2, \dots$$

Diese *Fixpunktiteration* erzeugt eine Folge  $(x_i)$ . Zeigen Sie, dass diese gegen den Fixpunkt  $x^*$  konvergiert. Geben Sie auch eine Fehlerabschätzung der Form

$$|x_i - x^*| \leq C_i |x_0 - x^*| \tag{1}$$

an. Wie hängen die  $C_i$  von der Kontraktionsrate  $L \in [0, 1)$  ab?

d) Die Ungleichung (1) ist eine sogenannte *a priori-Fehlerabschätzung*. Sie sagt die Konvergenzgeschwindigkeit der Iteration in Abhängigkeit von  $L$  voraus.

Eine während des Ablaufes der Iteration auswertbare, sogenannte *a posteriori-Fehlerabschätzung* erhält man daraus mittels  $|x_0 - x^*| \leq b - a$ , sofern man die Kontraktionsrate  $L$  kennt.

Zeigen Sie, dass auch folgende, meist bessere a-posteriori-Abschätzung gilt:

$$|x_i - x^*| \leq \frac{L}{1 - L} |x_i - x_{i-1}|. \tag{2}$$

---

Gesucht ist eine Lösung  $x = x^* \in [0, 1]$  der Gleichung  $x^5 + 6x - 1 = 0$ . Dies ist äquivalent zur Lösung der Fixpunktgleichung

$$x = f(x), \quad f: [0, 1] \rightarrow [0, 1] : \quad f(x) = \frac{1 - x^5}{6}.$$

- a) Zeigen Sie: *Die Funktion  $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$  ist eine Kontraktion.*
- b) Führen Sie einige Schritte der Fixpunktiteration am Rechner aus, z.B. ausgehend von  $x_0 := \frac{1}{2}$ , und vergleichen Sie die echten Fehler  $x_i - x^*$  mit der Abschätzung (2). Was beobachten Sie?

Hinweis: Die exakte Lösung ist  $x^* \approx 0.166645246965575 \dots$

---

- 
- a) Sei  $I$  ein Intervall,  $f: I \rightarrow \mathbb{R}$  Lipschitz-stetig, und  $(x_n)$  sei eine Cauchyfolge in  $I$ . Zeigen Sie:
- $(f(x_n))$  ist ebenfalls eine Cauchyfolge.*
- b) Sei nun  $f$  nur als gleichmäßig stetig vorausgesetzt. Gilt dann die Behauptung aus a) noch immer?
- c) Gleiche Frage wie zuvor, wobei  $f$  nur als stetig vorausgesetzt sei.
-

---

Eine physikalische Größe  $x$  wird gemessen, wobei ein kleiner Messfehler der maximalen Größe  $\delta$  unvermeidlich ist, d.h. die Messung liefert einen Wert  $\tilde{x}$  mit  $|\tilde{x} - x| \leq \delta$ . Wir interessieren uns für den Wert  $f(x)$ , wobei  $f$  eine gegebene Funktion ist, und fragen nach dem Effekt des Messfehlers in  $x$  auf den Funktionswert  $f(x)$ .

- a) Die Funktion  $f$  sei als stetig vorausgesetzt (sonst sei über  $f$  nichts bekannt). Kann man dann eine explizite Schranke für den maximalen Messfehlereffekt  $|f(\tilde{x}) - f(x)|$  angeben?
  - b) Welche zusätzliche Information über  $f$  wird benötigt, damit eine Schranke für  $|f(\tilde{x}) - f(x)|$  angegeben werden kann, und wie lautet diese Schranke?
  - c) Sei konkret  $f(x) = \sqrt{x}$  und  $x, \tilde{x} > 0$ . Geben Sie die gesuchte Schranke an. Ihr Kommentar dazu?
-

---

Bestimmen Sie die Polstellen und deren Ordnungen für folgende Funktionen in Abhängigkeit des Parameters  $a \in \mathbb{R}$  und skizzieren Sie den Funktionsverlauf für die verschiedenen Fälle:

**a)**  $f(x) = \frac{x^2 + 2x + a}{(x - 1)^2}$

**b)**  $f(x) = \frac{x^2 + ax + 8}{x^2 - 4}$

---

- 
- a)** Wir betrachten die Funktionen  $f_n(x) = x^n$  für  $x \in [0, 1]$  ( $n \in \mathbb{N}_0$ ).

Geben Sie für jede dieser Funktionen eine möglichst kleine Lipschitzkonstante an. Was passiert für  $n \rightarrow \infty$ ? Interpretieren Sie die Aussage anhand einer Skizze.

- b)** Zeigen Sie, dass jedes Polynom  $p(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n$  auf  $[0, 1]$  Lipschitzstetig ist, und geben Sie eine Lipschitzkonstante an.
- c)** Angenommen,  $p(x)$  gemäß **b)** hat keine Nullstelle in  $[0, 1]$ . Geben Sie eine Lipschitzkonstante für die Funktion  $1/p(x)$  an.
-

---

Gegeben sei eine stetige Funktion  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  mit  $f(a) > 0$  und  $f(b) > 0$ . Wir wissen sonst nichts über diese Funktion, außer:

- a) Es sei zusätzlich bekannt, dass es ein  $c$  in  $(a, b)$  gibt mit  $f(c) < 0$ . Wieviele Nullstellen besitzt  $f$  mindestens in  $(a, b)$ ? Geben Sie offene Intervalle, an in denen diese sich befinden.
- b) Welche Aussage über Anzahl und Lage der Nullstellen in  $(a, b)$  kann man treffen, wenn bekannt ist, dass es mindestens eine gibt?
- c) Welche Aussage über Anzahl und Lage der Nullstellen in  $(a, b)$  kann man treffen, wenn bekannt ist, dass es ein  $c \in (a, b)$  gibt mit  $f(c) > 0$ ?
- d) Kann man in irgendeinem der drei Fälle **a)**, **b)**, **c)** eine Aussage über die maximal mögliche Anzahl von Nullstellen in  $(a, b)$  treffen?
- e) Ist es möglich, dass ein Intervall  $[c, d] \subseteq (a, b)$  existiert mit  $f(x) = 0$  für alle  $x \in [c, d]$ ? Welche Intervalle  $[c, d]$  kommen dafür infrage?

Begründen Sie ihre Antworten, geben Sie Beispiele an, und stellen Sie verschiedene Fälle grafisch dar.

---



---

Die Funktion  $\operatorname{Li}_k(x) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^k}$  nennt man den *Polylogarithmus* vom Grad  $k$ . (Für  $k = 1$  erhält man den gewöhnlichen natürlichen Logarithmus  $\ln x$ .)

Zeigen Sie, dass  $\operatorname{Li}_3(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^3}$  (der Trilogarithmus) auf  $[0, 1]$  wohldefiniert und Lipschitz-stetig ist, und bestimmen Sie eine Lipschitzkonstante  $L$ .

Hinweis: Verwenden Sie eine Folge von Lipschitzkonstanten für die Funktionen  $x^n: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ ,  $n \in \mathbb{N}$ .

---

---

Welche der folgenden Aussagen sind wahr bzw. falsch?

**a)** Seien  $f$  und  $g$  gerade Funktionen.

(i)  $(fg)(x) = f(x) \cdot g(x)$  ist ebenfalls gerade.

(ii)  $(f \circ g)(x) = f(g(x))$  ist ebenfalls gerade.

**b)** Seien  $f$  und  $g$  ungerade Funktionen.

(i)  $(fg)(x) = f(x) \cdot g(x)$  ist ebenfalls ungerade.

(ii)  $(f \circ g)(x) = f(g(x))$  ist ebenfalls ungerade.

**c)** Seien  $f$  und  $g$  monoton wachsende Funktionen.

$(f \circ g)(x) = f(g(x))$  ist ebenfalls monoton wachsend.

**d)** Seien  $f$  und  $g$  monoton fallende Funktionen.

$(f \circ g)(x) = f(g(x))$  ebenfalls monoton fallend.

**e)** Sei  $(x_n)$  eine Folge reeller Zahlen und  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  eine stetige Funktion.

Dann ist auch die Folge der  $(f(x_n))$  der Funktionswerte garantiert beschränkt.

**f)** Sei  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  eine stetige Funktion mit der Eigenschaft  $f(0) = 0$ , und  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  eine konvergente Reihe.

Dann ist auch die Reihe  $\sum_{n=1}^{\infty} f(a_n)$  der Funktionswerte garantiert konvergent.

---

---

Gegeben sei die Funktion  $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \frac{1}{1+x^4}$

- a) Geben das Bild  $B := f([0, \infty))$  an.
  - b) Zeigen Sie, dass  $f$ , aufgefasst als Funktion  $f: [0, \infty) \rightarrow B$ , bijektiv ist, und geben Sie die Umkehrfunktion  $f^{-1}$  an.
  - c) Was ändert sich, wenn  $f$  als Funktion definiert auf ganz  $\mathbb{R}$  betrachtet wird?
-