
Pflichtbeispiel: Gegeben sei die Differentialgleichung

$$\ddot{y}(t) - 3\dot{y}(t) + 2y(t) = 0.$$

- (a) Berechnen Sie ein reelles Fundamentalsystem $\{y_1(t), y_2(t)\}$ der gegebenen Differentialgleichung.

- (b) Bestimmen Sie eine reelle Partikulärlösung $y_p = y_p(t)$ der Differentialgleichung

$$\ddot{y}(t) - 3\dot{y}(t) + 2y(t) = 6e^{-t}.$$

- (c) Bestimmen Sie die reelle Lösung $y = y(t)$ für das Anfangswertproblem

$$\ddot{y}(t) - 3\dot{y}(t) + 2y(t) = 6e^{-t}, \quad y(0) = \dot{y}(0) = 4.$$

-
1. Berechnen Sie mit Hilfe eines Ansatzes eine partikuläre Lösung der Differentialgleichung

$$\frac{d^2}{dt^2}y(t) + \frac{d}{dt}y(t) - 2y(t) = 5e^t.$$

2. Betrachten Sie für $a \in \mathbb{R}$ die Differentialgleichung

$$\ddot{y}(t) - 2\dot{y}(t) + ay(t) = 0.$$

Geben Sie in Abhängigkeit von $a \in \mathbb{R}$ die möglichen Lösungen der homogenen Differentialgleichung an. Betrachten Sie insbesondere die Lösung für $a = 0$.

3. Berechnen Sie die Lösung $y = y(t)$ des Anfangswertproblems

$$\ddot{y} + 5\dot{y} + 6y = \cos t, \quad y(0) = \dot{y}(0) = \frac{11}{10}.$$

Untersuchen Sie das Verhalten der Lösung, d.h. skizzieren Sie die Lösung und bestimmen Sie $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t)$.

4. Lösen Sie das Randwertproblem

$$y'' - y = 1, \quad y(0) = y'(1) = 0.$$

5. Berechnen Sie die Lösung des Randwertproblems

$$y'' + y = 0, \quad y(0) = y(\pi) = 0.$$

Untersuchen Sie die Existenz und Eindeutigkeit der Lösung.

6. Lösen Sie die Differentialgleichung

$$\ddot{y} - 2\dot{y} + y = e^t$$

nach $y = y(t)$.

7. Betrachten Sie die Funktion $f(x) = 4x$ auf $[-\pi, \pi]$, die außerhalb des Intervalls periodisch fortgesetzt wird. Die Funktion lässt sich durch eine klassische Fourierreihe $a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx))$ darstellen.

Berechnen Sie die Fourierkoeffizienten a_0, a_k, b_k , mit $k \in \mathbb{N}$.

8. Betrachten Sie die Funktion $f(x) = |\cos(x)|$, auf $[0, 2\pi]$, die außerhalb der Intervalls periodisch fortgesetzt wird. Berechnen Sie die Fourierkoeffizienten a_0, a_k, b_k .

Lösungen

1. $y_p(t) = \frac{5}{3}te^t$
2.
 - 1. Fall: $y_h(t) = c_1 e^{(1-\sqrt{1-a})t} + c_2 e^{(1+\sqrt{1-a})t}$
 - 2. Fall: $y_h(t) = c_1 e^t + c_2 t e^t$
 - 3. Fall:
komplex: $y_h(t) = e^t \left(c_1 e^{(-i\sqrt{|1-a|})t} + c_2 e^{(i\sqrt{|1-a|})t} \right)$
reell: $y_h(t) = e^t \left(c_1 \cos(\sqrt{|1-a|}t) + c_2 \sin(\sqrt{|1-a|}t) \right)$
 - Fall $a = 0$: $y_h(t) = c_1 e^{2t} + c_2$
3. $y(t) = 4e^{-2t} - 3e^{-3t} + \frac{1}{10} \cos t + \frac{1}{10} \sin t$.
4. $y(x) = \frac{e^x + e^{2-x} - 1 - e^2}{(1+e^2)}$
5. $y(x) = c \sin(t)$
6. $y(t) = c_1 e^t + c_2 t e^t + \frac{t^2 e^t}{2}$.
7. $a_0 = 0, a_k = 0, b_k = -8 \frac{(-1)^k}{k}$
8. $a_0 = \frac{2}{\pi}, a_k = \begin{cases} 0 & \text{für } k \text{ ungerade} \\ -\frac{4}{\pi(k^2-1)}(-1)^{\frac{k}{2}} & \text{für } k \text{ gerade} \end{cases}, b_k = 0 \text{ für alle } k$