

2. Tutorium - Quantentheorie I

17.10.2014

1. Beantworten Sie folgende Fragen:

- Die Ionisierungsenergie des Wasserstoffatoms (im Grundzustand) liegt bei $E_{\text{ion}} = 13.6\text{eV}$. Berechnen Sie die Frequenz und Wellenlänge der elektromagnetischen Strahlung die in diesem Fall für die Ionisierung mindestens benötigt wird. Um welche Art von Strahlung handelt es sich dabei?
- In der Nähe des Atomkerns kann die Energie eines Photons in ein Elektron-Positron-Paar konvertiert werden. Berechnen Sie die minimale Energie des Photons (in MeV) die für diesen Prozess vonnöten ist. Berechnen Sie wiederum Frequenz und Wellenlänge der entsprechenden elektromagnetischen Strahlung.
- Ein He-Ne-Laser emittiert monochromes Licht mit einer Wellenlänge von $\lambda = 633\text{nm}$. Wieviele Photonen werden von dem Laser pro Sekunde emittiert, wenn dieser eine Leistung von 1mW hat?
- Berechnen Sie die Frequenz und Wellenlänge von Elektronen, wenn diese durch eine Spannungsdifferenz von 1000V beschleunigt wurden.

2. Ein freies Teilchen der Masse m bewege sich auf einem eindimensionalen Stab der Länge L . Die Dynamik des Teilchens ist bestimmt durch folgende Schrödingergleichung,

$$H_0\psi(x, t) = i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(x, t), \quad \text{mit} \quad H_0 = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}. \quad (1)$$

- Berechnen Sie die stationären Zustände für dieses System (gegeben durch $\phi_n(x)\exp[-iE_nt/\hbar]$) unter Annahme von periodischen Randbedingungen an den beiden Enden des Stabes ($x = 0, L$). Geben Sie den Randbedingungen physikalischen Sinn.
- Wievielfach sind die einzelnen Energieeigenwerte E_n entartet? (Der Grad der Entartung M des Eigenwertes E_n ist gegeben durch die Anzahl von zueinander linear unabhängigen Eigenvektoren $[\phi_n(x)]_i$, die demselben Eigenwert E_n zugeordnet sind.)

c) Zeigen Sie explizit dass jeder Zustand der Form,

$$\tilde{\phi}_n(x) = \sum_{i=1}^M c_{n,i} [\phi_n(x)]_i, \quad (2)$$

Eigenzustand zu H_0 ist, unabhängig von den komplexen Koeffizienten $c_{n,i}$.

d) Skizzieren Sie die Dispersionsrelation des Systems.

3. Berechnen Sie die Energieniveaus eines linearen harmonischen Oszillators (in einer Dimension) mit Masse m und Schwingungsfrequenz ω , bestimmt durch folgende Hamilton-Funktion,

$$\mathcal{H}(q, p) = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega^2 q^2, \quad (3)$$

mit Hilfe der Bohr-Sommerfeldschen-Quantisierungsbedingung. Die Quantisierungsregel lautet

$$\oint_{\mathcal{H}(q,p)=E} p dq = nh, \quad n = 1, 2, 3, \dots, \quad (4)$$

wobei das Integral über eine Periode der Bahn mit der konstanten Energie $\mathcal{H}(q, p) = E$ auszuführen ist.

Zu kreuzen: 1,2,3